



ネオール[®] 10mg カプセル、25mg カプセル、50mg カプセル、サンディミュン[®] カプセル 25mg、50mg

患者向けしおり改訂内容のお知らせ


2004年7月

販売
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30 〒106-8618

◆改訂後患者向けしおり

ネオールカプセル		サンディミュンカプセル	
(表面)	(裏面)	(表面)	(裏面)
<p>ネオールカプセルを服用される方へ</p> <p>注意：以下の場合は必ず主治医に相談してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●薬を服用して発疹などが出たことがある。 ●ほかに薬を服用している。(薬間で買った薬も) ●妊娠または授乳中である。 ●最近予防接種を受けた、もしくは予防接種を受ける予定がある。 <p>服用について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●服用方法：このお薬(カプセル)は、服用する直前にアルミシートから取り出してください。また、必ず指示に従い、コップ1杯の水または常温の水と一緒に服用してください。 ●服用し忘れた場合：気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。 ●絶対に2回分をまとめて1度には服用しないでください。 ●併用での注意：このお薬を服用しているときにグレープフルーツジュースを飲むと、この薬の作用が強くなることが知られていますので、避けてください。 ●セイコフトキリン(セント・ジョンズ・ワート)を含む健康食品といっしょに服用すると、この薬の作用が強くなることが知られていますので、避けてください。 ●あやまって多く服用した場合：すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 ●高齢者の方へ：特に指示を守って服用してください。 ●その他：自分の判断で服用をやめたり、サンディミュンを服用しないでください。  <p>裏面も必ずご覧ください。</p>	<p>保管上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●保管するときは薬の包装のまま保存してください。カプセルを包装から取り出したままにすると、カプセルが柔らかくなったり、カプセル内に含まれている成分が蒸発することがあります。 ●小児の手の届かない場所に保管してください。 <p>主治医または薬局の連絡先</p> <p>ノバルティス ファーマ株式会社 ネオール ホームページ http://www.neoral.jp</p> <p>NEORAL (N202) 2004年4月改訂 740075-G-1405</p>	<p>サンディミュンカプセルを服用される方へ</p> <p>注意：以下の場合は必ず主治医に相談してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●薬を服用して発疹などが出たことがある。 ●ほかに薬を服用している。(薬間で買った薬も) ●妊娠または授乳中である。 ●最近予防接種を受けた、もしくは予防接種を受ける予定がある。 <p>服用について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●服用方法：このお薬(カプセル)は、服用する直前にアルミシートから取り出してください。また、必ず指示に従い、コップ1杯の水または常温の水と一緒に服用してください。 ●服用し忘れた場合：気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。 ●絶対に2回分をまとめて1度には服用しないでください。 ●併用での注意：このお薬を服用しているときにグレープフルーツジュースを飲むと、この薬の作用が強くなることが知られていますので、避けてください。 ●セイコフトキリン(セント・ジョンズ・ワート)を含む健康食品といっしょに服用すると、この薬の作用が強くなることが知られていますので、避けてください。 ●あやまって多く服用した場合：すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 ●高齢者の方へ：特に指示を守って服用してください。 ●その他：自分の判断で服用をやめたり、サンディミュンカプセルを服用しないでください。  <p>裏面も必ずご覧ください。</p>	<p>保管上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●保管するときは薬の包装のまま保存してください。カプセルを包装から取り出したままにすると、カプセルが柔らかくなったり、カプセル内に含まれている成分が蒸発することがあります。 ●小児の手の届かない場所に保管してください。 <p>主治医または薬局の連絡先</p> <p>ノバルティス ファーマ株式会社 サンディミュン ホームページ http://www.sandimmun.jp</p> <p>SANDIMMUN (N202) 2004年4月改訂 740075-G-1405</p>

◆改訂内容(改訂部分抜粋、ネオールカプセル及びサンディミュンカプセル共通)

改訂前	改訂後
<p>服用し忘れた場合： 気がついた時にできるだけ早く服用してください。ただし、次の通常服用する時間が近い場合は、忘れた分は服用しないで1回分を飛ばしてください。</p>	<p>服用し忘れた場合： 気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。</p>
<p>併用での注意： グレープフルーツジュースといっしょに服用すると、この薬の作用が強くなるということが知られていますので避けてください。</p> 	<p>併用での注意： このお薬を服用しているときにグレープフルーツジュースを飲むと、この薬の作用が強くなるということが知られていますので避けてください。</p> <p>イラストを削除</p>
<p>保管上の注意： 保管するときは薬の包装のまま保存してください。</p>	<p>保管上の注意： 保管するときは薬の包装のまま保存してください。カプセルを包装から取り出したままにすると、カプセルが柔らかくなったり、カプセル内に含まれている成分が蒸発することがあります。</p>